

Даний лікарський засіб не зареєстрований для застосування в Україні. Інформація надана згідно з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу, зареєстрованого Європейською медичною агенцією (ЕМА) або у одній з країн ЄС.

Якщо Вам стало відомо про виникнення побічної реакції у Вас або близької людини, або про випадок відсутності ефекту від будь-якого з продуктів компанії АстраЗенека, будь ласка, повідомте про це до ТОВ «АстраЗенека Україна» у один із наведених нижче способів. Це можливо здійснити за телефоном: +38 050 382 99 89 або електронною поштою PatientSafety.Ukraine@astrazeneca.com Також, ви можете повідомити нам дану інформацію за посиланням:

<https://contactazmedical.astrazeneca.com/content/astrazeneca-champion/ua/uk/amp-form.html>

(виберіть мову та опцію- «повідомити про побічну реакцію»).

This medicine is not authorized in Ukraine. The information is provided as per the instruction for medical use of the medicine authorized by the European Medicines Agency (EMA) or in one of the EU countries.

If you or your relative have experienced an adverse reaction or absence of the effect on any of AstraZeneca's products, please notify AstraZeneca Ukraine LLC in one of the following ways. This is possible by phone: +38 050 382 99 89 or by e-mail PatientSafety.Ukraine@astrazeneca.com Also, you can tell us this information at: <https://contactazmedical.astrazeneca.com/content/astrazeneca-champion/en/en/amp-form.html> (select a language and an option "report an adverse reaction").

Листок- вкладиш: Інформація для пацієнта

Symbicort, 160 мкг/4,5 мкг/суспензія дозована для інгаляції під тиском Будесонід/формотеролу фумарату дигідрат

Прочитайте уважно весь цей листок-вкладиш, перш ніж розпочати застосування цього лікарського засобу, тому що в ньому міститься важлива для вас інформація.

- Збережіть цю інструкцію. Можливо, вам доведеться прочитати її ще раз.
- Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до свого лікаря або фармацевта.
- Цей препарат призначений особисто вам. Його не слід передавати іншим особам. Це може завдати їм шкоди, навіть якщо симптоми їхнього захворювання подібні до тих, які спостерігаються у вас.
- Якщо у вас виникли побічні ефекти, проконсультуйтеся з лікарем або фармацевтом. Це стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не зазначених у цьому листі-вкладиші. Див. розділ 4.

Зміст цього листка-вкладиша:

1. Що представляє собою лікарський засіб Symbicort та для чого він використовується
2. Про що потрібно знати перед початком застосування лікарського засобу Symbicort
3. Як застосовувати лікарський засіб Symbicort
4. Можливі побічні ефекти
5. Як зберігати лікарський засіб Symbicort
6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Що представляє собою лікарський засіб Symbicort та для чого він використовується

Symbicort — це інгалятор, який використовується для лікування симптомів хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ) у дорослих віком від 18 років. ХОЗЛ — це тривале захворювання дихальних

шляхів у легенях, яке часто обумовлене курінням. Symbicort містить два різні препарати: будесонід і формотеролу фумарату дигідрат.

- Будесонід належить до групи лікарських засобів, які називаються «кортикостероїди». Він працює, зменшуючи та запобігаючи набряку та запаленню в легенях.
- Формотеролу фумарату дигідрат належить до групи лікарських засобів, які називаються «агоністами бета₂-адренорецепторів тривалої дії» або «бронходилататорами». Він працює, розслаблюючи м'язи дихальних шляхів. Це допомагає легше дихати.

Не використовуйте цей препарат для усунення нападу астми.

2. Про що потрібно знати перед початком застосування лікарського засобу Symbicort

Не можна застосовувати лікарський засіб Symbicort в таких випадках:

- якщо у вас алергія на будесонід, формотерол або будь-який з інших інгредієнтів цього лікарського засобу (перелічених у розділі 6);

Особливості застосування

Перед застосуванням препарату Symbicort проконсультуйтеся з лікарем чи фармацевтом, якщо:

- Ви діабетик.
- У вас інфекція дихальних шляхів.
- У вас високий артеріальний тиск або у вас коли-небудь були проблеми з серцем (в тому числі неритмічного серцебиття, дуже прискорений пульс, звуження артерій або серцева недостатність).
- У вас проблеми зі щитовидною залозою або наднирниками.
- У вас низький рівень калію в крові.
- У вас є серйозні захворювання печінки.

Зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте нечіткість зору або інші порушення зору.

Діти та підлітки

Лікарський засіб Symbicort не рекомендований дітям та підліткам до 18 років.

Інші ліки та лікарський засіб Symbicort

Повідомте лікаря або фармацевта, якщо ви зараз приймаєте, нещодавно приймали або маєте приймати будь-які інші ліки.

Зокрема, повідомте лікаря або фармацевта, якщо ви приймаєте будь-який з наступних препаратів:

- Бета-блокатори (наприклад, атенолол або пропранолол для лікування високого артеріального тиску), включно очні краплі (наприклад, тимолол для лікування глаукоми).
- Ліки для прискореного або неритмічного серцевого ритму (наприклад, хінідин).
- Ліки, такі як дигоксин, що часто використовуються для лікування серцевої недостатності.
- Діуретики, також відомі як «сечогінні таблетки» (наприклад, фуросемід). Вони використовуються для лікування високого артеріального тиску.
- Стероїдні препарати, що приймають перорально (наприклад, преднізолон).
- Препарати групи ксантинів (наприклад, теофілін або амінофілін). Вони часто використовуються для лікування ХОЗЛ або астми.
- Інші бронходилататори (наприклад, сальбутамол).
- Трициклічні антидепресанти (такі як амітриптилін) і антидепресант нефазодон.
- Препарати групи фенотіазину (такі як хлорпромазин і прохлорперазин).
- Препарати, що називаються «інгібітори ВІЛ-протеази» (такі як ритонавір) для лікування ВІЛ-інфекції.
- Препарати для лікування інфекцій (такі як кетоконазол, ітраконазол, вориконазол, позаконазол, кларитроміцин та телітроміцин).
- Препарати для лікування хвороби Паркінсона (наприклад, леводопа).

- Препарати для лікування проблем із щитовидною залозою (наприклад, левотироксин).

Якщо ви маєте будь-що з переліченого вище або ви не впевнені чи маєте, порадьтеся з лікарем чи фармацевтом перед тим, як приймати лікарський засіб Symbicort.

Також повідомте лікаря або фармацевта, якщо ви збираєтеся мати загальну анестезію під час операції або стоматологічних процедур.

Вагітність, годування груддю та фертильність

- Якщо ви вагітні або плануєте вагітність, проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням препарату Symbicort — не використовуйте Symbicort, доки лікар не порадить вам це зробити.
- Якщо ви завагітніли під час застосування препарату Symbicort, не припиняйте застосування препарату Symbicort, але негайно зверніться до лікаря.
- Якщо ви годуєте груддю, проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням препарату Symbicort.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами

Symbicort не впливає або має незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами.

3. Як застосовувати лікарський засіб Symbicort

- Слід завжди використовувати цей препарат точно за інструкціями лікаря. Якщо ви не впевнені як приймати цей препарат, зверніться до лікаря або фармацевта.
- Важливо використовувати Symbicort щодня, навіть якщо у вас немає симптомів ХОЗЛ на той момент.

Звичайна доза — дві інгаляції двічі на день. Лікарський засіб Symbicort не рекомендований дітям та підліткам до 18 років.

Якщо ви приймаєте стероїдні таблетки для лікування ХОЗЛ, лікар може зменшити кількість таблеток, які ви приймаєте, як тільки ви почнете застосовувати лікарський засіб Symbicort. Якщо ви приймаєте пероральні стероїдні таблетки протягом тривалого часу, лікар може попросити вас час від часу здавати аналізи крові. При зменшенні прийому пероральних стероїдних таблеток ви можете відчувати загальне нездужання, навіть якщо симптоми з боку дихальної системи можуть покращуватися. Ви можете відчувати такі симптоми, як закладеність носу або нежить, слабкість або біль у суглобах чи м'язах і висип (екзема). Якщо будь-який із цих симптомів турбує вас, або якщо виникають такі симптоми, як головний біль, втома, нудота або блювота, негайно зверніться до лікаря. Можливо, вам буде потрібно застосовувати інші ліки, якщо у вас з'являться симптоми алергії або артрити. Вам слід проконсультуватися з лікарем, якщо ви стурбовані тим, чи слід продовжувати використовувати лікарський засіб Symbicort.

Ваш лікар може розглянути питання про додавання стероїдних таблеток до вашого звичайного лікування в періоди стресу (наприклад, коли у вас є інфекція дихальних шляхів або перед операцією).

Важлива інформація щодо симптомів ХОЗЛ

Якщо під час застосування препарату Symbicort ви відчуваєте, що у вас задишка або хрипи, вам слід продовжувати застосовувати лікарський засіб Symbicort, але потрібно якомога швидше звернутися до лікаря, оскільки вам може знадобитися додаткове лікування.

Негайно зверніться до лікаря, якщо:

- Ваше дихання погіршується або ви часто прокидаєтеся вночі, відчуваючи задишку.
- Вранці виникає відчуття стиснення в грудях або відчуття стиснення у грудях триває довше, ніж зазвичай.

- Ці симптоми можуть означати, що ХОЗЛ не контролюється належним чином, і вам може знадобитися інше або додаткове лікування.

Лікар також може призначити інші бронходилататори, наприклад, антихолінергічні засоби (такі як тіотропій або іпратропію бромід) для лікування ХОЗЛ.

Інформація щодо лікарського засобу Symbicort

- Перш ніж почати застосовувати лікарського засобу Symbicort, зніміть обгортку з фольги. Викиньте обгортку, а також осушувач, який знаходиться всередині обгортки. Якщо осушувач витік із власної упаковки, не використовуйте інгалятор.
- Після того як ви вийняли інгалятор із фольги, ви повинні використати його протягом 3 місяців. Запишіть дату закінчення використання (3 місяці з моменту відкриття обгортки) на етикетці інгалятора, щоб нагадати вам, коли слід припинити застосування інгалятора.
- Частини вашого інгалятора показані на рисунку. Інгалятор буде вже зібраний, коли ви його вперше отримаєте. Не розбирайте його. При ослабленні з'єднання балончика, необхідно закріпити його в інгаляторі та продовжувати користуватися інгалятором.




Підготовка лікарського засобу Symbicort

Необхідно підготувати інгалятор до використання в таких ситуаціях:

- Якщо ви використовуєте новий інгалятор Symbicort вперше.
- Якщо ви не використовували його більше 7 днів.
- Якщо він впав.

Щоб підготувати інгалятор до використання, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

- Добре струсіть інгалятор протягом щонайменше 5 секунд, щоб перемішати вміст аерозольного балончика.
- Зніміть ковпачок з мундштука, злегка натиснувши на виступи збоку. Ремінець на ковпачку мундштука залишиться прикріпленим до інгалятора.
- Тримайте інгалятор вертикально. Потім натисніть лічильник (на верхній частині інгалятора), щоб зробити впорскування в повітря. Ви можете використовувати одну або обидві руки, як показано на рисунках.



- Приберіть палець (пальці) від лічильника.
- Зачекайте 10 секунд, добре струсіть, а потім повторіть кроки 3 та 4.
- Тепер інгалятор готовий до використання.

Як робити інгаляцію

Кожен раз, коли вам потрібно зробити інгаляцію, дотримуйтесь інструкцій нижче:

1. Добре струсіть інгалятор протягом щонайменше 5 секунд, щоб перемішати вміст аерозольного балончика.
2. Зніміть ковпачок з мундштука, злегка натиснувши на виступи збоку. Перевірте, чи не заблокований мундштук.
3. Тримайте інгалятор вертикально (одною або обома руками). Спокійно видихніть.
4. Акуратно помістіть мундштук між зубами. Закрийте губи.
5. Почніть повільно і глибоко вдихати через рот. Щільно натисніть лічильник (на верхній частині інгалятора), щоб зробити впорскування. Після натискання лічильника продовжуйте вдихнути деякий час. Вдих одночасно з натисканням на лічильник гарантує, що препарат досягне ваших легень.
6. Затримати подих на 10 секунд або так довго, як вам буде зручно.
7. Перш ніж видихнути, зніміть палець з лічильника та вийміть інгалятор з рота. Тримайте інгалятор вертикально.
8. Потім повільно видихніть. Щоб зробити ще одну інгаляцію, добре струсіть інгалятор протягом щонайменше 5 секунд і повторіть кроки з 3 по 7.
9. Встановіть на місце ковпачок мундштука.
10. Після щоденного ранкового і вечірнього застосування прополощіть рот водою та виплюньте її.



Використання спейсера


Ваш лікар, медсестра або фармацевт можуть запропонувати вам використовувати спейсер (наприклад, **AeroChamber Plus Flow Vu** або **AeroChamber Plus**). Дотримуйтесь інструкцій, наведених у листі-вкладиші, яка додається до спейсера.

Очищення інглятора Symbicort


- Протирайте внутрішню та зовнішню частини мундштука принаймні раз на тиждень сухою серветкою.
- Не використовуйте воду чи інші рідини та не виймайте балончик з інглятора.

Як я дізнаюся, що настав час замінити Symbicort?

- Лічильник у верхній частині інглятора повідомляє, скільки інгаляцій (активацій) залишилося у вашому інгляторі Symbicort. Відлік починається зі 120 інгаляцій, коли інглятор повний.



- Кожного разу, коли ви робите інгаляцію або впорскування у повітря, стрілка веде відлік в зворотному напрямку до нуля («0»).
- Коли стрілка вперше потрапляє в жовту зону, це означає, що залишилося близько 20 інгаляцій.



- Коли стрілка досягне «0», ви повинні припинити використання інглятора Symbicort. Інгалятор може не відчуватися порожнім, і може здаватися, що він все ще працює. Однак ви не отримаєте потрібної кількості препарату, якщо будете продовжувати його використовувати.

Якщо ви прийняли препарат Symbicort в більшій дозі, ніж потрібно

Якщо ви прийняли препарат Symbicort в більшій дозі, ніж потрібно, зверніться до лікаря або фармацевта за порадою. Можуть виникнути такі ефекти: тремтіння, головний біль або прискорене серцебиття.

Якщо ви забули прийняти препарат Symbicort

- Якщо ви забули прийняти дозу лікарського засобу Symbicort, прийміть її одразу, як згадаєте. Однак, якщо настав час для наступної дози, не приймайте пропущену дозу.
- **Не** приймайте препарат в подвійній дозі, щоб надолужити його прийом, про який ви забули.

Якщо ви припинили застосування препарату Symbicort

Перш ніж припинити застосування препарату Symbicort, порадьтеся з лікарем або фармацевтом. Якщо ви припинили застосування препарату Symbicort, симптоми ХОЗЛ можуть погіршитися.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо використання цього препарату, зверніться до лікаря або фармацевта.

4. Можливі побічні ефекти

Як і всі лікарські засоби, цей препарат може викликати побічні ефекти, хоча й не в усіх.

Якщо з вами сталося будь-що з наведеного нижче, негайно припиніть застосування препарату Symbicort і негайно зверніться до лікаря:

- Набряк обличчя, особливо навколо рота (язика та/або горла та/або утруднення ковтання), висип або кропив'янка разом із утрудненням дихання (ангіоневротичний набряк) та/або раптовим відчуттям слабкості. Це може означати, що у вас є алергічна реакція. Це трапляється рідко, менше ніж у 1 з 1 000 осіб.
- Раптове гостре свистяче дихання або задишка відразу після використання інгалятора. При виникненні будь-якого з цих симптомів негайно припиніть використання препарату Symbicort та скористайтеся своїм інгаляційним бронхолітиком для усунення нападу астми. Негайно зверніться до лікаря, оскільки вам може знадобитися змінити лікування. Це трапляється дуже рідко, менше ніж у 1 з 10 000 осіб.

Інші можливі побічні ефекти;

Часто (можуть виникати не більше ніж у 1 з 10 осіб)

- Серцебиття (відчуття биття серця), тремтіння або тремор. Якщо ці ефекти виникають, вони зазвичай легкі та зазвичай зникають, якщо ви продовжуєте використовувати препарат Symbicort.
- Молочниця (грибкова інфекція) у роті. Це менш імовірно, якщо після використання препарату Symbicort полоскати рот водою.
- Легкий біль у горлі, кашель і хрипкий голос.
- Головний біль.
- Пневмонія (легенева інфекція) у хворих на ХОЗЛ.

Повідомте лікаря, якщо під час прийому препарату Symbicort у вас виникли будь-які з наступних симптомів, що можуть бути симптомами легеневої інфекції:

- Лихоманка або озноб.
- Збільшення вироблення слизу, зміна кольору слизу.
- Посилений кашель або утруднення дихання.

Нечасто (можуть виникати не більше ніж у 1 зі 100 осіб)

- Почуття нервозності, нервозності або збудження.
- Порушений сон.
- Відчуття запаморочення.
- Нудота (відчуття, що вас нудить).
- Часте серцебиття.
- Синці на шкірі.
- Судоми м'язів.
- Нечіткість зору.

Рідко (можуть виникати не більше ніж у 1 з 1 000 осіб)

- Висипання, свербіж.
- Бронхоспазм (звуження м'язів дихальних шляхів, що викликає свистяче дихання). Якщо свистяче дихання виникає раптово після застосування препарату Symbicort, припиніть застосування препарату Symbicort і негайно зверніться до лікаря.
- Низький рівень калію в крові.
- Неритмічне серцебиття.

Дуже рідко (можуть виникати не більше ніж у 1 з 10 000 осіб)

- Депресія.
- Зміни в поведінці, особливо у дітей.
- Біль у грудях або стиснення у грудях (стенокардія).
- Підвищення рівня цукру (глюкози) в крові.
- Зміна смаку, наприклад, неприємний присмак у роті.
- Зміна артеріального тиску.

Інгаляційні кортикостероїди можуть впливати на нормальне вироблення стероїдних гормонів в організмі, особливо якщо ви застосовуєте високі дози протягом тривалого часу. Ефекти включають:

- зміна мінеральної щільності кісток (витончення кісток)
- катаракта (помутніння кришталика в оці)
- глаукома (підвищення тиску в оці)
- уповільнення темпів росту дітей і підлітків
- вплив на наднирники (невеликі залози поруч з нирками).

Ймовірність виникнення таких ефектів набагато менша в разі застосування інгаляційних кортикостероїдів, у порівнянні з кортикостероїдами в таблетованій формі.

Повідомлення про побічні ефекти

Якщо у вас виникнуть будь-які побічні ефекти, проконсультуйтеся з лікарем, фармацевтом або медсестрою. Це стосується будь-яких можливих побічних ефектів, не зазначених у цьому листі-вкладиші. Ви також можете повідомити про будь-які побічні ефекти через **національну систему обліку**, наведену в [Додатку V](#). Повідомляючи про побічні ефекти, ви можете допомогти в зборі додаткової інформації, що стосується безпеки цих ліків.

5. Як зберігати лікарський засіб Symbicort

- Зберігати в недоступному для дітей місці та поза полем їхнього зору.
- Цей лікарський засіб не можна використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці, картонній пачці та обгортці з фольги після слів «ВЖИТИ ДО». Дата закінчення терміну дії відноситься до останнього дня зазначеного місяця.
- Як і у випадку з більшістю інгаляційних ліків у балончиках під тиском, ефект цього препарату може зменшуватися, коли балончик холодний. Для досягнення найкращих результатів перед застосуванням цей препарат має бути кімнатної температури. Не зберігайте у холодильнику чи морозильнику. Захищайте від морозу та прямих сонячних променів.
- Після того як ви вийняли інгалятор із фольги, ви повинні використати його протягом 3 місяців. Запишіть дату закінчення використання (3 місяці з моменту відкриття обгортки) на етикетці інгалятора, щоб нагадати вам, коли слід припинити застосування інгалятора.
- Завжди щільно встановлюйте ковпачок мундштука та фіксуйте його після використання інгалятора.
- Жодні лікарські засоби не можна зливати в каналізацію або викидати разом із побутовими відходами. Про те, як утилізувати більше непотрібні препарати, ви можете дізнатися у свого фармацевта. Ці заходи допоможуть захистити довкілля.

Застереження: Балончик містить рідину під тиском. Не піддавайте впливу температури вище 50 °C. Не проколюйте балончик. Балончик не можна розбивати, проколювати або спалювати навіть якщо він здається порожнім.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Вміст лікарського засобу Symbicort

Діючі речовини — будесонід і формотеролу фумарату дигідрат. Кожне впорскування (активація) містить 160 мкг будесоніду та 4,5 мкг формотеролу фумарату дигідрат.

Допоміжні речовини — апафлуран (HFA 227), повідон та макрогол. Це інгалятор без фреонів.

Як виглядає лікарський засіб Symbicort та вміст упаковки

Symbicort — це інгалятор, що містить лікарський засіб. Балончик під тиском із прикріпленим індикатором дози містить суспензію білого кольору для інгаляцій. Балончик вставлений в червоний пластиковий дозатор з білим пластиковим мундштуком та прикріпленим сірим пластиковим

ковпачком. Кожен інгалятор містить 120 інгаляцій (активацій) після того, як він був підготовлений до використання. Кожен інгалятор окремо упакований в фольгу, що містить осушувач.

Symbicort, 160 мкг/4,5 мкг/суспензія дозована для інгаляції під тиском (будесонід/формотеролу фумарату дигідрат) доступний в упаковках по одному інгалятору.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник

[Заповнюється в країні реєстрації]

Цей лікарський засіб зареєстрований у державах-членах ЄЕЗ під такими назвами:

Країна	Торгова назва та дозування
Австрія	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Бельгія	Symbicort 160 microgram /4,5 microgram/inhalatie, aërosol, suspensie Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation, Druckgasinhalation, Suspension
Болгарія	Симбикорт 160 мікрограма /4,5 мікрограма/впръскване Суспензия под налягане за инхалация
Хорватія	Symbicort 160 mikrograma /4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
Кіпр	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Чеська республіка	Symbicort 160 micrograms /4,5 micrograms/inhalation, suspension in pMDI
Данія	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Естонія	Symbicort
Фінляндія	Symbicort 160 mikrog /4.5 mikrog/inhalaatio
Франція	Symbicort 200/6 microgrammes par inhalation, suspension pour inhalation en flacon préssurisé
Німеччина	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Греція	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Угорщина	Symbicort 4,5 mikrogramm /160 mikrogramm/ adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió
Ісландія	Symbicort 160 míkrógrömm /4,5 míkrógrömm/ inhalation
Ірландія	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Італія	Symbicort
Латвія	Symbicort 160 mikrogrami /4.5 mikrogrami/ inhalācijā, izsmidzinājumā, aerosols inhalācijām zem spiediena
Литва	Symbicort 160 mikrogramų/4,5 mikrogramo/išpurškime suslėgtoji įkvepiamoji suspensija
Люксембург	Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
Мальта	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Нідерланди	Symbicort aërosol 200/6, 200 microgram /6 microgram per dosis, aërosol, suspensie
Норвегія	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/ inhalasjon
Польща	Symbicort
Португалія	Symbicort 160 microgramas /4,5 microgramas/inalação Suspensão pressurizada para inalação
Румунія	Symbicort 160 micrograme /4.5 micrograme/inhalație, suspensie de inhalat presurizată
Словаччина	Symbicort 160 mikrogramov /4,5 mikrogramov/inhalačná dávka, inhalačná suspenszia v tlakovom obale

Словенія	Symbicort 160 mikrogramov /4,5 mikrograma na vdih, inhalacijska suspenzija pod tlakom
Іспанія	Symbicort 160 microgramos /4,5 microgramos/inhalación suspensión para inhalación en envase a presión
Швеція	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Велика Британія	Symbicort 200 micrograms/6 micrograms actuation pressurised inhalation, suspension

Дата останнього перегляду тексту листа-вкладиша: ММ.РРРР

[Заповнюється в країні реєстрації]